

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

DICIEMBRE DE 2015 EN CASTILLA Y LEÓN

CÁLIDO O MUY CÁLIDO, ESCASAS PRECIPITACIONES Y NIEBLAS PERSISTENTES.

Como el mes anterior, Diciembre ha sido un mes caracterizado por prolongados periodos de estabilidad y predominio de la componente Sur, con altas temperaturas y con nieblas persistentes en la meseta. La influencia de bajas presiones atlánticas en intervalos más cortos ha dejado escasas precipitaciones, sobre todo en el Este y Sureste.

TEMPERATURAS

Diciembre ha sido **MUY CÁLIDO** en Castilla y León, con una anomalía positiva de 2 °C en la temperatura media. Únicamente en el Noroeste de la Comunidad y en zonas del Valle del Duero, donde las nieblas se han mantenido de manera persistente durante varios días, la valoración es de **CÁLIDO**. Destacan de manera especial los valores de temperatura máxima y, sobre todo, los registrados en los días centrales del mes, cuando de manera generalizada se sitúan por encima de su promedio, llegando incluso a superar en 10 °C valor esperado. A lo largo del mes se registran episodios en los que se llegan a superar los 19 °C en zonas del Sur de la Comunidad, con algunas efemérides (en Salamanca/Matacán los días 3 y 5 se alcanzan los 19,4 °C, el mayor valor en este Observatorio para este mes); pero también en el Norte y en el Este se superan los 17 °C. Dejando al margen los datos diarios, lo más significativo es el valor medio de la temperatura máxima, pues es efeméride en todos los Observatorios situados al Sur y al Este de Castilla y León y también en algunas zonas de meseta (Salamanca, Ávila, Segovia, Soria, Burgos y Villanubla), lo que da una idea de su carácter térmico siendo el mes de diciembre con un mayor registro medio de temperaturas máximas desde 1950. En la tabla anexa se detallan los valores registrados en los Observatorios. En cuanto a las temperaturas mínimas, se han situado en valores más normales, aunque también en los días centrales del mes han superado su promedio. El valor más bajo se registró el día 1 en Aranda de Duero (Burgos) con -9,0 °C, en una clara situación de inversión térmica pues en La Covatilla (Salamanca), a una altitud de 2.000 m, la temperatura no bajó de 4,4 °C. En esa fecha se destaca también la fuerte oscilación térmica, que llega a superar los 20 °C, salvo en las zonas de niebla persistente, en que las temperaturas apenas varían (en Zamora osciló entre -2,0 °C y 0,5 °C)

PRECIPITACIONES

En cuanto a la precipitación, el mes ha sido en general **SECO** en el Oeste y Noroeste y **MUY SECO** en el resto. Únicamente se han superado los 50 l/m² en la Cordillera Cantábrica, en Sanabria y en la vertiente Sur del Sistema Central de Ávila y Salamanca, siendo el valor más alto de 72 mm en Sanabria. En gran parte del Este de la Comunidad no se superan los 10 l/m². Se han registrado numerosos episodios de niebla, llegando a alcanzar en algunos puntos de la provincia de Zamora hasta 20 días de niebla en el mes.

Valladolid, 8 de Enero de 2016

***Nota:** Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.*

©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma”.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE



Delegación Territorial
en Castilla y León

Observatorio	Media TMax	Efeméride	Media Tmín	Media mensual	Efeméride	Anomalía(81/10)	Carácter
PONFERRADA	10,0	12,6 (1989)	2,7	6,3	10,1 (1989)	0,9	Cálido
SORIA	12,1	10,9 (1989)	-1,1	5,5	6,4 (1989)	1,5	Muy Cálido
BURGOS/Villafría	11,8	10,0 (1953)	0,8	6,3	7,0 (1989)	2,4	Muy Cálido
VALLADOLID	10,5	11,7 (1989)	2,2	6,4	8,9 (1989)	1,4	Muy Cálido
ÁVILA	13,0	10,8 (1961)	2,6	7,8	6,6 (1989)	3,8	Extremadamente Cálido
SEGOVIA	14,7	11,7 (1989)	4,5	9,6	8,5 (1989)	4,5	Extremadamente Cálido
VALLADOLID/Villanubla	10,8	10,4 (1989)	0,7	5,8	7,7 (1989)	1,7	Muy Cálido
ZAMORA	9,4	12,4 (1989)	3,0	6,2	9,7 (1989)	0,7	Cálido
LEÓN/ V.Camino	8,6	10,6 (1983)	1,6	5,1	7,3 (1953)	0,9	Cálido
SALAMANCA/Matacán	13,7	12,1 (1989)	-0,4	6,7	9,1 (1989)	1,8	Muy Cálido
Media	11,5		1,7	6,6		2,0	

Todas las unidades en °C.

Los datos remarcados en rojo son aquellos en los que el valor registrado en este año ha superado el valor máximo de la serie para cada Observatorio y alcanza, por tanto, la condición de EFEMÉRIDE (los valores registrados como efeméride hasta la fecha se indican en la columna 'Efeméride')

La anomalía de temperatura media del mes corresponde a la diferencia con el promedio del treintenio 1981-2010.

El mes de Diciembre de 2015 es el que ha registrado mayor valor de Temperatura Media de Máximas (teniendo en cuenta todos los observatorios) desde 1950.

El mes con mayor registro de Temperatura Media corresponde a 1989 (la temperatura mínima fue significativamente más alta que en el mes de diciembre del año actual)

Los años 2002 y 2000 también registraron valores medios más altos. En estos años, el mes de Diciembre tuvo un carácter Húmedo o Muy Húmedo.

Se destaca el valor medio de TMáx en Segovia (3°C por encima de la efeméride anterior) y la anomalía de la Temperatura media (4,5 °C).