GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

AEMet Agencia Estatal de Meteorología
Delegación Territorial en Extremadura

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL (ABREVIADO)

Enero de 2013 en Extremadura

La precipitación en el mes de enero ha sido deficitaria en casi todas las comarcas de la Región excepto en Las Villuercas, La Vera y pequeñas zonas al suroeste de Badajoz en las que se ha superado la media. En la mayor parte de Extremadura no se han superado los 80 litros/m², excepto en el norte de Cáceres y en Las Villuercas.

En términos globales, haciendo la media para todos los puntos de la Región, podemos decir que la precipitación media, para toda Extremadura, durante el pasado mes de enero, ha sido de 67 litros/m², frente a los 78 litros/m² que refleja la media histórica, es decir, que hemos registrado un déficit medio de -11 litros/m², o una precipitación del 86% del valor medio, o esperado.

En cuanto a los valores termométricos registrados en el mes de enero, podemos observar que las temperaturas máximas medias han estado algo más bajas de la media, mientras que las mínimas algo más altas. Los valores medios observados han oscilado entre 08 y 16 ºC, para las máximas medias y entre 2 y 8 ºC las mínimas medias mensuales.

En términos globales, haciendo la media para todos los puntos de la Región, se ha estimado que al temperatura media ha sido de 8.0 ºC, frente a los 7.2 ºC que refleja la media histórica.

Globalmente para toda Extremadura podemos caracterizar el mes como húmedo en cuanto a las precipitaciones, y cálido respecto a las temperaturas.

PRECIPITACIONES MENSUALES (litros/m²)

Estación	Precipitación	Porcentaje	Carácter pluviométrico
BADAJOZ	52,2	109%	húmedo
CÁCERES	58,6	109%	húmedo
MÉRIDA	46,7	111%	húmedo
DON BENITO	49,6	110%	húmedo
ZAFRA	60,2	86%	normal

PRECIPITACIONES AÑO AGRÍCOLA (desde septiembre hasta el mes actual) (litros/m²):

Estación	Precipitación	Porcentaje	Carácter pluviométrico
BADAJOZ	305,0	109%	húmedo
CÁCERES	364,1	111%	húmedo
MÉRIDA	287,4	104%	muy húmedo
DON BENITO	341,2	144%	muy húmedo
ZAFRA	419,4	130%	húmedo

Porcentaje: Cociente entre la precipitación media y la normal para del periodo de referencia, expresada en %.

Carácter térmico del mes: “muy húmedo”, “húmedo”, “normal”, “seco” o “muy seco”, según los quintiles de las precipitaciones del periodo de referencia 1971-2000. “extremadamente” seco o húmedo cuando la precipitación este fuera del rango en dicho periodo.

CORREO ELECTRONICO
usuariosext@aemet.es

Apdo. de Correos 30173
06011 BADAJOZ
Tel.: 924 286 428
Fax.: 924 276 905

TEMPERATURAS (ºC):

Estación	Temperatura media	Anomalía	Carácter térmico del mes
BADAJOZ	9,8	2,0	cálido
CÁCERES	8,5	0,8	normal
MÉRIDA	9,5	0,6	normal
DON BENITO	9,0	1,1	cálido
ZAFRA	8,7	0,8	normal

Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia, expresada en ºC

Carácter térmico del mes: “muy frío”, “frío”, “normal”, “cálido” o “muy cálido”, según los quintiles de las temperaturas medias del periodo de referencia 1971-2000. “extremadamente” frío o cálido cuando la temperatura este fuera del rango en dicho periodo.

Notas:

1. Los datos empleados en este avance climatológico son provisionales y está sujetos a una posterior validación.

2. © AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.

3. Fecha de obtención de los datos: 4 de febrero de 2012