

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL (ABREVIADO)

## Marzo de 2013 en Extremadura

El mes de marzo se ha caracterizado por una gran y continua inestabilidad debida al paso de sucesivos frentes asociados a borrascas atlánticas.

Ha sido el más lluvioso de los que se tiene registro en Extremadura. En términos globales, haciendo la media para todos los puntos de la Región, podemos decir que las precipitaciones acumuladas en marzo superaron el 300% del valor medio. Así mismo, el promedio de número de días de precipitación en este mes es de 21, muy superior a la media (8 a 9 días).

En el balance de la precipitación acumulada para el año civil, desde enero hasta marzo, es positivo entre el 20-130 % en toda la Región.

En el balance de la precipitación acumulada para el año hidrometeorológico, meses de septiembre a marzo también ha sido positivo, entre 8-80%.

En cuanto a los valores termométricos registrados en el mes de marzo, podemos observar que tanto las temperaturas máximas medias como las mínimas han estado más bajas de la media siendo más acusado en las temperaturas máximas. Los valores medios observados han oscilado entre 11 y 16 °C, para las máximas medias y entre 5 y 8 °C las mínimas medias mensuales.

**Globalmente para toda Extremadura podemos caracterizar el mes como extremadamente húmedo en cuanto a las precipitaciones, y normal respecto a las temperaturas.**

### PRECIPITACIONES MENSUALES (litros/m<sup>2</sup>)

| Estación   | Precipitación | Porcentaje | Carácter pluviométrico |
|------------|---------------|------------|------------------------|
| BADAJOS    | 156,6         | 522%       | extremadamente húmedo  |
| CÁCERES    | 212,5         | 510%       | extremadamente húmedo  |
| MÉRIDA     | 132,3         | 364%       | extremadamente húmedo  |
| DON BENITO | 156,2         | 444%       | extremadamente húmedo  |
| ZAFRA      | 168,6         | 269%       | muy húmedo             |

### PRECIPITACIONES AÑO AGRÍCOLA (desde septiembre hasta el mes actual) (litros/m<sup>2</sup>):

| Estación   | Precipitación | Porcentaje | Carácter pluviométrico |
|------------|---------------|------------|------------------------|
| BADAJOS    | 496,0         | 142%       | muy húmedo             |
| CÁCERES    | 659,7         | 157%       | muy húmedo             |
| MÉRIDA     | 480,9         | 127%       | muy húmedo             |
| DON BENITO | 540,0         | 163%       | muy húmedo             |
| ZAFRA      | 660,2         | 145%       | muy húmedo             |

Porcentaje: Cociente entre la precipitación media y la normal para del periodo de referencia, expresada en %.

Carácter térmico del mes: "muy húmedo", "húmedo", "normal", "seco" o "muy seco", según los quintiles de las precipitaciones del periodo de referencia 1971-2000. "extremadamente" seco o húmedo cuando la precipitación este fuera del rango en dicho periodo.



AEMET

## TEMPERATURAS (°C):

| Estación   | Temperatura media | Anomalía | Carácter térmico del mes |
|------------|-------------------|----------|--------------------------|
| BADAJOS    | 12,2              | -0,6     | cálido                   |
| CÁCERES    | 10,6              | -1,5     | normal                   |
| MÉRIDA     | 11,8              | -1,7     | normal                   |
| DON BENITO | 12,0              | -0,9     | cálido                   |
| ZAFRA      | 10,8              | -0,6     | normal                   |

Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia, expresada en °C

Carácter térmico del mes: "muy frío", "frío", "normal", "cálido" o "muy cálido", según los quintiles de las temperaturas medias del periodo de referencia 1971-2000. "extremadamente" frío o cálido cuando la temperatura este fuera del rango en dicho periodo.

### Notas:

1. Los datos empleados en este avance climatológico son provisionales y está sujetos a una posterior validación.
2. © AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.
3. Fecha de obtención de los datos: 8 de abril de 2013