



### TEMPERATURAS anomalías



En general, el mes de agosto tuvo un comportamiento muy cálido en la mayor parte de Aragón. Las anomalías observadas oscilaron entre valores de +0,1 °C en Valpalmas y de +2,7 °C en Albarracín, con un promedio regional de +1,2 °C con respecto a las medias habituales del mes (periodo de referencia 1981-2010).

	Normal mes (°C)	Ago 2017 (°C)	Anomalía (°C)	Carácter
ZARAGOZA/AEROPUERTO	25,2	25,8	0,6	Cálido
HUESCA/PIRINEOS	23,9	24,2	0,3	Cálido
TERUEL	21,8	23,7	1,9	Muy Cálido

### PRECIPITACIONES porcentaje acumulado



El carácter pluviométrico de agosto fue en general húmedo, aunque con distribución muy irregular de sus precipitaciones: en las Cinco Villas, Ibérica zaragozana y centro de Teruel fue muy húmedo, por el contrario, en el Pirineo y la zona oriental de la Comunidad fue seco, incluso muy seco en algunos puntos. El porcentaje de precipitación promedió un 120% con respecto a las normales de referencia, con un rango que osciló entre valores alrededor del 20% en Benabarre y del 400% en Borja.

	Normal mes (mm)	Ago 2017 (mm)	Anomalía (mm)	Porcentaje (%)	Carácter
ZARAGOZA/AEROPUERTO	16,6	18,8	2,2	113	Húmedo
HUESCA/PIRINEOS	30,1	19,6	-10,5	65	Normal
TERUEL	35,2	45,2	7,0	128	Húmedo