


AVANCE CLIMATOLÓGICO DE MARZO DE 2013 EN ASTURIAS

TEMPERATURAS: Frío en el litoral y muy frío en el interior.

Este mes de marzo comenzó cálido hasta el día 11 para terminar frío o muy frío el resto de los días. Continuando con la tendencia de meses anteriores, la anomalía negativa ha sido claramente más evidente en las máximas diurnas, debido al elevado nivel de humedad ambiental. En promedio para todo el Principado, se ha registrado una temperatura media de 8.8 °C, 0.6 °C por debajo de la media 1971-2000. El mes de marzo más frío desde 1931 fue el de 1971 con 6.0 °C, y el más cálido el de 1957 con 12.3 °C de media.




Las líneas gruesas indican los valores medios de las temperaturas máxima, media y mínima de la serie 1971-2000.

TEMPERATURA MARZO (°C)	MÍNIMA			MEDIA			MÁXIMA		
	NORMAL	2013	Carácter	NORMAL	2013	Carácter	NORMAL	2013	Carácter
CARREÑA DE CABRALES	5.5	4.3	MF	10.1	8.9	MF	14.8	13.5	MF
LLANES	7.9	7.3	MF	11.3	11.2	N	14.7	15.1	C
AMIEVA, PANIZALES	5.4	5.8	N	10.4	10	F	15.3	14.1	F
BARGAEDO PILOÑA	3.8	4	N	9.5	9.1	F	15.1	14.3	F
COLUNGA	6.7	5.6	MF	10.5	10.2	F	14.3	14.7	C
CABO PEÑAS	8.3	7	MF	11	9.7	MF	13.6	12.4	MF
ASTURIAS/AVILÉS	6.3	7	C	10.1	10.9	C	14	14.8	C
PAJARES - VALGRANDE	-0.2	-2.3	MF	3.3	0.1	EF	6.9	2.6	EF
RONZÓN	3.2	4.2	MC	9.2	9	N	15.1	13.8	MF
CUEVAS DE FELECHOSA	2.2	2.5	N	7.2	6.7	F	12.2	10.8	F
MIERES-BAIÑA	4.4	4.6	N	10.5	10	F	16.6	15.4	MF
SOTO DE LA BARCA	3.8	3.4	F	9.1	8.8	F	14.5	14.2	F
POLA DE SOMIEDO-DEPURADORA	2.6	2.9	N	8.1	7.2	F	13.5	11.4	MF
CAMUÑO	5.2	4.6	F	10.2	9.4	F	15.2	14.2	MF
CABO BUSTO	7.3	7.3	N	10.9	10.9	N	14.5	14.5	C
DEGAÑA, COTO CORTÉS	-0.1	-0.9	F	4.2	2.2	MF	8.6	5.2	MF
SAN ANTOLIN DE IBIAS-LINARES	3.6	3.1	F	8.1	6.5	F	12.6	9.8	F
FIGUERAS DE CASTROPOL	6.9	5.9	MF	10.9	10.1	MF	14.9	14.3	F
OURIA DE TARAMUNDI	5.7	5.1	F	9.7	8.6	MF	13.7	12.2	MF

Carácter termométrico del mes: "MF: Muy frío", "F: Frío", "N: Normal", "C: Cálido" o "MC: Muy cálido", según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1971-2000. ("E: Extremadamente" frío o cálido cuando se supera el récord del periodo). Las anomalías de temperatura están calculadas respecto a los valores medios del mes en la serie 1971-2000.




AEMet



PRECIPITACIONES: Húmedo en la mitad occidental, normal en el resto.


Dando un descanso a las enormes cantidades de precipitación de los meses anteriores, Marzo comenzó muy seco para terminar siendo ligeramente húmedo. Únicamente en las zonas altas de la mitad sur ha sido húmedo o muy húmedo, manteniendo gran cantidad de nieve en cotas altas.



La línea verde indica la precipitación acumulada normal, considerando la media 1971-2000.
La línea azul indica lo acumulado este mes.

PRECIPITACIÓN MARZO (l/m ²)	TOTAL MENSUAL			AÑO HIDROLÓGICO OCTUBRE-MARZO		
	NORMAL	2013	Carácter(%)	NORMAL	2013	Carácter(%)
CARREÑA DE CABRALES	113	68	MS (60%)	734	989	MH (135%)
LLANES	96	103	N (107%)	619	854	MH (138%)
AMIEVA, PANIZALES	117	77	MS (66%)	726	925	MH (127%)
BARGAEDO PILOÑA	123	129	H (105%)	800	1069	MH (134%)
COLUNGA	92	120	H (130%)	617	907	EH (147%)
ASTURIAS/AVILÉS	93	128	MH (138%)	676	940	MH (139%)
RONZÓN	83	68	N (82%)	536	697	MH (130%)
CUEVAS DE FELECHOSA	130	105	S (81%)	824	1058	MH (128%)
MIERES-BAÍÑA	97	91	N (94%)	617	924	MH (150%)
SOTO DE LA BARCA	72	42	MS (58%)	523	575	H (110%)
POLA DE SOMIEDO-DEPURADORA	94	100	H (106%)	657	955	EH (145%)
DEGAÑA, COTO CORTÉS	126	160	H (127%)	987	1103	H (112%)
SAN ANTOLIN DE IBIAS-LINARES	92	148	MH (161%)	715	931	MH (130%)
FIGUERAS DE CASTROPOL	71	98	MH (138%)	528	700	MH (133%)
OURIA DE TARAMUNDI	94	137	MH (146%)	654	889	MH (136%)
PUERTO DE LEITARIEGOS	117	117	N (100%)	954	982	N (103%)


Carácter pluviométrico del periodo: "MS: Muy Seco", "S: Seco", "N: Normal", "H: Húmedo" o "MH: Muy Húmedo", según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1971-2000. ("E: Extremadamente" seco o húmedo cuando se supera el récord del periodo). El porcentaje de precipitación esta referido a las precipitaciones medias del mes del periodo 1971-2000.



Con bastantes días de precipitación, sobre todo en la segunda mitad del mes, en casi todos los concejos se han registrado cantidades relativamente normales de precipitación durante este mes de marzo. Únicamente en las zonas más altas del sur y en general en la mitad occidental y el litoral, se ha superado claramente el 100%. En promedio para toda Asturias este mes de marzo se han recogido 114 l/m², un 107% de los 106 l/m² de media en el periodo 1971-2000. El marzo más seco desde 1931, fue el de 1997 con 4.7 l/m², y el más lluvioso el de 1979 con 205 l/m².

Año hidrológico

Las cantidades de precipitación prácticamente normales acumuladas en este mes de marzo hacen que el presente año hidrológico en Asturias continúe extremadamente húmedo -141%-; el cuarto más húmedo desde 1931, solo superado por los años 1936, 1951 y 1960.



Valores extremos

MARZO 2013	MINIMA (°C)	DIA	MAXIMA (°C)	DIA	PRECIPITACION (mm)	DIA	RACHA (km/h)	DIA
CARREÑA DE CABRALES	-0.6	13	19.5	21	22.8	14	105	7
LLANES	2.1	12	20	21	52.2	12	87	7
AMIEVA, PANIZALES	-0.3	13	19.6	6	25.8	13	85	22
BARGAEDO PILOÑA	-0.8	2	20.2	6	42.8	13	66	7
COLUNGA	0.7	12	21.3	21	47.4	12	70	7
CABO PEÑAS	2.1	13	18	21	8.5	8	114	7
ASTURIAS/AVILÉS	1.5	13	21.1	5	45.4	12	117	7
PAJARES - VALGRANDE	-7.8	15	6.5	8	23.6	14	87	4
RONZÓN	-2	2	19.2	7	21.6	13	58	22
CUEVAS DE FELECHOSA	-3	2	14.8	6	22.6	13	74	4
MIERES-BAÍÑA	-0.2	2	21.8	8	33.6	12	63	21
OVIEDO	-0.8	2	20.2	6	29.4	12	86	7
SOTO DE LA BARCA	-0.1	13	21.3	21	13.2	13	55	22
POLA DE SOMIEDO-DEPURADORA	-3.7	2	15.7	8	23.6	11	75	7
CAMUÑO	0.1	13	21.8	21	26	12	69	7
CABO BUSTO	1.4	13	22.7	21	0	1	142	7
DEGAÑA, COTO CORTÉS	-7.6	15	10.1	21	28.2	15	54	4
SAN ANTOLIN DE IBIAS-LINARES	-2.2	12	16.5	21	43.2	11	103	7

En Oviedo a 27 de MARZO de 2013.

Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción, citando a AEMET como autora de la misma.